



病因症狀

好發年齡

25-44歲，增加速度是男性癌症之首，罹患年齡比其他癌症年輕10歲。
男性比女性有更高罹患率。且口腔癌、鼻咽癌的死亡平均年齡較其他癌症年輕。

病因

抽煙、喝酒、嚼檳榔、人類乳突瘤病毒感染和基因遺傳為主要致病因，其他像放射暴露、空氣污染、吸入傷害和慢性發炎也有可能是致病因。

症狀

頭頸癌的早期症狀並不明顯又無特異性，加上病患本身的疏忽，以致於往往失去早期診斷的先機而延誤治療。

大約有六大警訊，希望能提醒國人及早注意

- 一、頸部出現不對稱性腫塊。
- 二、口咽腔內出現超過兩星期的潰瘍、凸起或斑點。
- 三、聲音沙啞。
- 四、單側鼻塞、反覆性流鼻血。
- 五、單側聽力不良、單耳積水、耳脹、耳悶。
- 六、無上呼吸道感染，卻持續性喉嚨痛、耳朵痛。

分期

依照 T（原發腫瘤大小）N（頸部淋巴結轉移否）M（是否遠端轉移）分期，可分為

期數	T	N	M
0	浸潤前癌	無遠處轉移	未觸及區域淋巴結腫
1	腫瘤直徑<2cm	無遠處轉移	未觸及區域淋巴結腫
2	腫瘤<2cm，少許浸潤	無遠處轉移	未觸及區域淋巴結腫
3	腫瘤>2cm周圍浸潤	無遠處轉移	未觸及區域淋巴結腫
	腫瘤直徑<2cm	無遠處轉移	同側觸及活動淋巴結
	腫瘤>2cm周圍浸潤	無遠處轉移	同側觸及活動淋巴結
4	腫瘤侵犯顱底	無遠處轉移	同側觸及活動淋巴結
	任何大小	無遠處轉移	對側或雙側觸及活動淋巴結
	任何大小	遠處轉移	任何淋巴結變化